

**TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO: LIGADURA ELÁSTICA DE
VARIZES POR ENDOSCOPIA**

A Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia é um procedimento realizado para tentar interromper o sangramento ativo ou recente das varizes de esôfago ou impedir que sangrem. As varizes de esôfago surgem em decorrência de doença no fígado que causa "hipertensão portal". O tratamento das varizes, portanto, é uma tentativa de minimizar danos já ocorridos ou em andamento. Tratar as varizes não significa tratar o problema no fígado. Pacientes com doença no fígado estão com deficiência imunológica, podem estar desnutridos pela doença e tem risco aumentado de sangramento. A Ligadura Elástica de Varizes Esofagianas consiste em três a cinco sessões (endoscopia + ligadura), habitualmente com intervalos de seis semanas. A partir do momento em que não houver mais varizes que possam ser submetidas a ligadura elástica, o Endoscopista poderá realizar Esclerose endoscópica. Independentemente de Ligadura ou Esclerose, o Médico Endoscopista orientará a data aproximada da próxima avaliação. É possível que o sejam necessárias endoscopias, ao menos anuais para controle.

As complicações do tratamento das varizes, apesar de raras, terão que ser tratadas e não há como prever se ocorrerão.

O procedimento será realizado com o paciente sob sedação analgésica executada por Anestesiologista, sendo que eventualmente poderá ser necessária a anestesia geral, com as complicações próprias do ato anestésico. Efeitos adversos da Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia:

- Dor retroesternal e disfagia (bastante frequentes)
- Sangramento por queda precoce de banda elástica (nas primeiras 72 horas [8%])
- Sangramento por queda da escara pós-ligadura elástica (em torno do 7º dia [8%])
- Estenose esofágica [2%]
- Peritonite bacteriana espontânea [2%]
- Pneumonia e/ou derrame pleural [2%]
- Mortalidade de 0,7%
- Provável necessidade de nova endoscopia nos primeiros dias após o procedimento, em decorrência de hemorragia.

=> Dieta líquida ou pastosa nos primeiros 5 dias.

=> Serão de 3 a 5 sessões iniciais de endoscopia com ligadura elástica a cada 6 semanas (intervalos de 15 a 30 dias a critério do endoscopista), com aumento dos intervalos, dependendo da resposta terapêutica, até a erradicação das varizes.

Estou ciente das informações acima citadas, bem como sobre o procedimento que será realizado. Ainda, estou ciente de que não deverei interromper o tratamento.

Assinatura do Paciente ou Responsável Legal